



Étude de cas sur les processus

Enseignements tirés des interventions de réduction du cheptel par abattage au Niger et au Mali

Contexte

Au cours des trois dernières décennies, les sécheresses sont devenues très fréquentes dans les pays du Sahel, puisqu'une année sur trois est déclarée déficitaire en termes de production de fourrage. Les sécheresses entraînent des pertes directes de bétail en raison de la mortalité des animaux et des pertes indirectes dues au dépérissement des bêtes, à la réduction de la production de lait, aux avortements, etc. C'est dans ce contexte que *Vétérinaires Sans Frontières Belgique* (VSF-B) a développé une stratégie d'urgence par réduction du cheptel pour : i) éviter les pertes dues à la sécheresse pour les éleveurs en achetant leurs animaux décharnés ; et ii) améliorer les régimes alimentaires des ménages pauvres grâce à la distribution de viande après l'abattage des animaux et une inspection sanitaire.

Activités

Les principales activités couvertes par la stratégie de réduction du cheptel comprenaient les éléments suivants :

- Sensibilisation des éleveurs et l'identification de sites pour pouvoir regrouper les animaux
- Ciblage des éleveurs
- Marquage des animaux
- Sensibilisation des participants aux critères de réduction du cheptel et à ses techniques
- Identification et groupement des animaux choisis comme étant destinés l'abattage
- Choix des lieux d'abattage
- Préparation des lieux d'abattage
- Recrutement des équipes d'abattage
- Abattage des animaux
- Rémunération des équipes d'abattage et logistique
- Sélection des ménages devant recevoir de la viande
- Distribution de la viande
- Suivi de l'opération
- Évaluation d'impact

Résultats

Au Niger, en 2011, 1.813 bovins fortement décharnés n'ayant plus de valeur marchande ont été sélectionnés dans le cadre de la réduction du cheptel. Plus de 79.270.000 francs CFA ont été distribués à 1.256 éleveurs, à raison d'une moyenne de 63.113 francs CFA par éleveur (30.000-50.000 francs CFA/tête de bétail et 1 à 2 bovins par éleveur). Ce montant permettait aux ménages de couvrir le coût de l'achat de deux à trois mois de céréales.

Au Mali, en 2019, 1.000 ménages à risque ont bénéficié d'une opération de réduction du cheptel ; 14 % de ces ménages étaient dirigés par des femmes. Dans cette intervention, 1.851 petits ruminants et 371 bovins ont été abattus, offrant 56.680 kg de viande à quelque 2.267 bénéficiaires, dont 65 % étaient des femmes.

Enseignements

Un certain nombre d'enseignements clés ont été tirés de ces deux opérations :

Calendrier : Il est préférable que le début de ce type d'opération de réduction du cheptel coïncide avec la période où les éleveurs commencent à se concentrer autour des quelques poches de pâturages restantes et des zones de pâturage protégées, c.-à-d. avant qu'ils ne connaissent des pertes importantes à cause de la sécheresse.

Préparation de la viande : Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre pour transformer la viande, il est préférable de distribuer de la viande fraîche avec de l'huile, de façon que les bénéficiaires puissent cuisiner la viande eux-mêmes. Dans ce cas, les bénéficiaires devraient être sélectionnés à l'avance de manière que la distribution puisse toucher les ménages les plus à risque. S'il existe suffisamment de main-d'œuvre pour transformer la viande, il devrait tout de même être conseillé aux bénéficiaires de recuire la viande avant de la consommer, pour réduire le risque de diarrhée.

Soutien aux veaux : Afin de protéger les veaux affaiblis dont la mère a été choisie comme faisant partie de la réduction du cheptel, il est utile de créer aussi des centres de relèvement pour les jeunes animaux. Une fois rétablis, ces veaux peuvent être restitués à leurs propriétaires.

Banque mobile : Lorsque des paiements aux participants des interventions de réduction du cheptel sont faits par des comptes d'argent mobile, cela présente moins de risques sécuritaires pour les participants et pour l'équipe de mise en œuvre.

Sources :

VSF-B (2010). *Destocking Operation in Niger: Lessons Learned in 2010*. Capitalization document. 31 pages / Opération déstockage, rapport d'activité 24 pages

Gilles Vias (2016) *Emergency destocking as a food and pastoral crisis mitigation strategy in Niger in 'Strengthening resilience to food and nutrition insecurity in Sahel and West Africa.'* Knowledge Share Fair, Ouagadougou, Burkina. 54-56p. FAO.

VSF-B (2019). *Operation destocking in Mali. Final Report OSRO/ML/803/SWE and OSRO/ML/805/CHA*

Les études de cas de LEGS montrent les bonnes pratiques à adopter en réponse à une situation d'urgence en matière d'élevage. Elles couvrent les six domaines d'interventions techniques de LEGS, les huit principes de LEGS ainsi que les contextes plus larges abordés dans la troisième édition du manuel LEGS. Les **études de cas sur les processus** illustrent l'application des orientations de LEGS et les **études de cas sur les impacts** se penchent sur les résultats des interventions.

- ▶ Vous pouvez accéder à toutes les études de cas de LEGS à partir de livestock-emergency.net/resources/case-studies
- ▶ Pour plus d'information, consultez le manuel Normes et directives pour l'aide d'urgence à l'élevage sur livestock-emergency.net

